Tensor Renormalization Group Approach to Two-dimensional Classical Lattice Models

Michael Levin and Cody P. Nave
PRL 99, 120601(2007)

2014/10/10
酒井 慧

- Introduction
- The TRG method
- A Simple example
- Summary

Introduction

- Tensor Renormalization Group(TRG) methodは従来のモンテカルロmethodに代わり提案された方法
- TRG methodの利点
 - 1, Sign problem がない
 - 2, 複素Lagrangianの系に対しても使える

The TRG method

- 局所相互作用の系の分配関数

$$Z = \sum_{ijk\dots} e^{-S(i,j,k,\dots)} = \sum_{ijk\dots} T_{ijk} T_{ilm} T_{jnp} T_{kqr}\dots$$

→ Tensor network model
として自然に書ける

The TRG method

- TRG methodは2つの過程で行われる
 - 1、linkをつなぎかえる
 - 2、縮約をとる

$$\sum_n S_{ikn} S_{jln} \approx \sum_m T_{ijm} T_{klm}$$

$$T'_{ijk} = \sum_{pqr} S_{kpq} S_{jqr} S_{irp}$$

The TRG method

1、linkをつなぎかえる

$$\sum_n S_{ikn} S_{jln} \approx \sum_m T_{ijm} T_{klm}$$

The TRG method

2、縮約をとる

$$T'_{ijk} = \sum_{pqr} S_{kpq} S_{jqr} S_{irp}$$

TRG method

The TRG method

- どのようにしてテンソルSを見つけるか？

- Tの積を行列Mだと考え

$$\sum_m T_{ijm} T_{klm} = M_{ij,kl} \quad (M: D^2 \times D^2 \text{ matrix})$$

- 以下を最小とするようにする

$$|M - S^T S|^2$$

- そのために特異値分解をする

$$M_{ij,kl} = \sum_n S_n U_{li,n} V_{jk,n}^*$$

- U, Vはユニタリ一行列

The TRG method

- 大きいDまでの特異値に対応する部分だけで

$$S^A_{li,n} = \sqrt{S_n} \tilde{U}_{li,n}$$

$$S^B_{jk,n} = \sqrt{S_n} \tilde{V}^*_{li,n}$$

- とすると

$$\sum_n S^B_{jk,n} S^A_{li,n} \approx \sum_m T_{ijm} T_{klm}$$

- この工程と縮約をとる

$$T'_{ijk} = \sum_{pqr} S_{kpq} S_{jqr} S_{irp}$$

- 粗視化ができる

A Simple example

- 三角格子上のIsing model に対してTRG methodを用いる
- 分配関数はdomain wall構造の和として書ける
D=2のtensor network
- i=1:no domain wall i=2:domain wall

とするとtensor の要素は

$$T^{111} = 1, T^{221} = T^{212} = T^{122} = \alpha$$

$$\alpha = e^{-2\beta J}$$

A Simple example

- 自由エネルギー
 $F = -(N\beta)^{-1} \log(Z)$
- 微分して1スピンあたりの磁化Mを出す

Summary

- TRG methodによる2次元古典格子modelの粗視化手続を導入した
- 三角格子Ising modelを用いてTRG methodの有効性を確認した
- 現在は様々な系に対してTRG methodが使われている